

Rouge-queue à front blanc

Le Rouge-queue à front blanc hoche souvent sa queue d'un roux marqué.

Description

- Ailes brun-noir.
- Queue assez longue, **rousse** avec une barre longitudinale brun foncé au centre.
- **Mâle** gris-bleu dessus, **front blanc**, face, joues et gorge noires, **poitrine et flancs rouge orangé vif, ventre blanc**.
- **Femelle** brun-gris pâle dessus, gorge blanchâtre, dessous crème teinté de roux sur les flancs.
- **Jeune** brun moucheté de roussâtre dessus, et crème roussâtre barré de brun foncé dessous.
- Bec assez long, droit et mince, noir ; Pattes noires, assez longues et fines.
- Longueur totale de 14 cm.
- Envergure de 20.5 à 24 cm.
- Poids de 10 à 20 g.



Habitat

- Le Rougequeue à front blanc est inféodé aux arbres.
- Forêts de feuillus claires, lisières de bosquets, haies, vergers, jardins et parcs.

Alimentation

- Il se nourrit généralement au sol, mais aussi sur les branches où il se perche volontiers.
- Consomme principalement des **insectes** (Papillons, Chenilles, Coléoptères) et des araignées, mais aussi quelques fruits.
- Depuis un poste de chasse élevé, il capture ses proies en plongeant, virevoltant un peu à la manière d'un Gobemouche.

Migrations

- Migrateur, le Rougequeue à front blanc arrive dans les premiers jours d'avril (parfois fin mars) et cherche activement les emplacements favorables à sa reproduction.
- Dans la deuxième quinzaine d'août, la migration postnuptiale démarre avec son apogée dans la deuxième semaine de septembre.
- Le Rougequeue à front blanc hiverne ensuite de l'Afrique du Nord jusqu'en Afrique Tropicale.

Reproduction

- le Rougequeue à front blanc **niche en cavité**, il a donc besoin de vieux arbres ou de nichoirs artificiels pour sa reproduction ; il niche également dans les **cavités des murs de construction**. (On le surnomme "l'oiseau des maçons").
- Il construit un nid d'herbes sèches et de mousse garni de plumes dans un **trou d'arbre, de rocher ou de mur**, le plus souvent à **moins de 3 m du sol**.
- Deux pontes par an (première quinzaine de mai et fin juin), de 5 à 7 oeufs turquoise, incubés par la femelle pendant 12 à 14 jours.
- Les juvéniles nidicoles s'envolent à 11 - 15 jours.